

Instrucciones de EGD

Dr. Seif, Dr. Kedika, & Dr. McDaniel



TEXAS GI

Endoscopy Center

Fecha del examen: _____ Hora de llegada: _____ am/pm en esta ubicación:

Texas GI Endoscopy Center
2704 N Galloway Ave
Mesquite, TX 75150

Baylor Scott and White Sunnyvale
231 S Collins Rd
Sunnyvale, TX 75182

- NO coma después de la medianoche
- NO beba nada 3 horas antes del procedimiento. NI SIQUIERA UN SORBO DE LIQUIDO
- Confirme su transporte. SIN TRANSPORTE, NO HAY PROCEDIMIENTO. SIN EXCEPCIÓN
- Los líquidos claros están bien hasta 3 horas antes del procedimiento. Nada con colorantes rojos/morados, ni lácteos
- Tome medicamentos para la presión arterial, el corazón y las convulsiones con un sorbo de agua
- Sostener el medicamento para la diabetes el día del procedimiento
- Checar el nivel de azúcar en la sangre antes de la llegada si es diabético
- Informe a la oficina si está tomando anticoagulantes, como: Prasugrel (Effient), Apixabán (Eliquis), Dabigatrán (Pradaxa), Clopidogrel (Plavix), Rivaroxabán (Plavix), Warfarina (Coumadin)
- Si se usa una inyección de GLP-1, como Ozempic, Mounjaro, Trulicity, etc, manténgala durante 7 días antes del procedimiento O solos líquidos claros, 24 horas antes del procedimiento
- Se aplicará un cargo de \$100 si no llama para cancelar/reprogramar su cita dentro de las 24 horas, o si no se presenta
- Habrá un cargo médico. Y un cargo a la clínica del centro para su procedimiento. La anestesia y la patología se facturarán por separado. Nos pondremos en contacto con usted para informarle de las tarifas pendientes
- No conducir ni regresar al trabajo durante el resto del día. Por favor, planifique con tiempo
- Planee pasar de 2 a 3 horas en la clínica del centro
- Dejar todas las joyas en casa
- IMPORTANTE: SI BEBE LÍQUIDOS DENTRO DE LAS 3 HORAS PREVIAS A SU PROCEDIMIENTO O COME DENTRO DE LAS 8 HORAS, SU PROCEDIMIENTO SE RETRASARÁ O INCLUSO SE CANCELARÁ